ИНДУКЦИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ ТРИПЛОИДИИ У ТИХООКЕАНСКИХ УСТРИЦ *CRASSOSTREA GIGAS* МЕТОДОМ ТЕПЛООВОГО ШОКА

А.В. Синенко*, А.А. Анисимова, С.Е. Лескова, И.А. Дмитриева

Институт Мирового океана, Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, sinenko.avia@dvf.u.ru*

Работа нацелена на отработку температурного метода получения жизнеспособного триплоидного спата тихоокеанской устрицы *Crassostrea gigas* путем подбора оптимальных условий для температурного блока мейоза при искусственном оплодотворении яйцекеток

В последние годы обозначился интерес к получению и выращиванию молоди *C. gigas* в России, в том числе в морских хозяйствах южного Приморья – в связи с увеличением спроса на товарную устрицу и необходимостью получения больших объемов посадочного материала.

Триплоидные устрицы как объект аквакультуры обладают рядом преимуществ:

- Ускоренный рост
 - Сохранение высоких органолептических показателей в течение всего года
 - Устойчивость к некоторым сезонным заболеваниям
- ← Ресурсы, используемые диплоидами для развития и функционирования половой системы, у триплоидов направляются на соматический рост.

Несмотря на то, что марикультура является одним из ведущих направлений хозяйственной деятельности на российском Дальнем Востоке, собственные технологии получения триплоидных моллюсков, как и опыт применения уже имеющихся наработок (США, Франция, Япония, Китай) отсутствуют. Назначение работы состоит в повышении темпов выращивания устриц до коммерческих размеров, улучшении товарного качества и вкусовых свойств конечного продукта в условиях приморских аквакультурных хозяйств.

- Дизайн эксперимента по индукции триплоидии
- Протестированы безопасность и эффективность температурного метода индукции генеративной триплоидии у тихоокеанской устрицы *C. gigas* при разных вариантах тепловой обработки оплодотворенных яйцекеток.
- В экспериментальном режиме были испытаны различные сочетания параметров: температура воздействия (32 и 36 °C), продолжительность воздействия (3, 5, 10 и 15 мин) и время начала воздействия (15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мин после оплодотворения).
- При использованной температуре стимуляции нереста (21 °C) отделение второго полярного тельца в 50 % яиц было зафиксировано через 25 мин после оплодотворения (Рис. 1), поэтому выбранный нами интервал воздействия (15–45 мин после оплодотворения) должен прекрывать оба деления мейоза вплоть до начала митотических делений зиготы.
- Эффективность разных вариантов воздействия в отношении индукции триплоидии была проверена на разных стадиях: велигер (2 дня развития), великонх (10 дней развития) и педивелигер (26 дней развития)
- Для скрининга использовали групповой подход, основанный на совместной дезагрегации личинок одной группы до состояния клеточной суспензии с оценкой содержания ДНК в ядрах, высвобождающихся в коллективный образец, методом проточной цитометрии (Рис. 3).

Для оценки вклада отдельных особей в коллективную ядерную суспензию дополнительно производили индивидуальную оценку плоидности личинок методом компьютерного анализа Z-стеков, полученных с помощью конфокального микроскопа (Рис. 4).

Рисунок 1 – Контроль оплодотворения и созревания яйцекеток тихоокеанской устрицы *C. gigas* при температуре нереста 21 °C. СП – сперматозоид, ЯЙ – яйцеклетка, ХР – хромосомы, ПТ-1 – первое полярное тельце, ПТ-2 – второе полярное тельце, М и Ж пронукул – мужской и женский пронукулы. Люминесцентная микроскопия; окраска DAPI; масштабный отрезок 20 мкм.

Оценка жизнеспособности личинок

- Безопасность разных вариантов воздействия была проверена путем мониторинга выживаемости, роста и развития личинок на всем протяжении их культивирования до стадии молоди (52 дня развития) (Рис. 2).
- В ходе культивирования были выявлены критические стадии развития, когда выживаемость личинок драматически снижалась.
- В разных группах, обработанных температурой 32 °C, выживаемость на одних и тех же стадиях варьировала от 1 до 99 %.
- Независимо от условий эксперимента, наилучшую выживаемость демонстрировали эмбрионы на стадии трохофоры и осевшая молодь при достижении возраста 42 и 52 дней.
- Критическими для всех групп оказались стадии велигера и великонхи, на которых наблюдали массовую гибель личинок с последующей стабилизацией численности особей после осадения на субстрат.
- Использование температуры 36 °C во всех вариантах привело к гибели личинок на стадии велигера.

Рисунок 2 – Личиночное развитие тихоокеанской устрицы *C. gigas*. а – трохофора; б – велигер; в – великонх; г – педивелигер с глазком; д – педивелигер; е – осевшая молодь. Масштабный отрезок 50 мкм.

Рисунок 3 – Анализ групповых дезагрегатов двухдневных личинок тихоокеанской устрицы *C. gigas* методом проточной цитометрии на предмет дифференциации ядер разной плоидности (n). а – диплоидные ядра на гистограммах распределения синглетов по сигналам светорассеяния; б – ядра разной плоидности на гистограммах распределения синглетов по сигналам светорассеяния; в – идентификация диплоидных (2n2c) ядер (выделены красным) на гистограммах распределения синглетов по интенсивности сигнала DAPI; г – идентификация диплоидных (2n2c) и триплоидных (3n3c) ядер (выделены красным) на гистограммах распределения синглетов по интенсивности сигнала DAPI.

Рисунок 4 – Компьютерный анализ конфокальных изображений двухдневных личинок тихоокеанской устрицы *C. gigas*. а – многосекционное полнообъемное изображение (Z-стек) личинки; б – оценка содержания ДНК в отдельных ядрах личинки. Красный цвет – клеточные ядра, окрашенные йодистым пропидием; зеленый цвет – выделение областей, соответствующих ядрам, для измерения содержания ДНК. Масштабный отрезок 10 мкм.

- Интерес представляют группы, полученные в результате теплового воздействия через 25-30 мин после оплодотворения, что соответствует времени отделения второго полярного тельца
- Индивидуальный анализ личинок показал, что реальное количество триплоидных особей в таких группах даже выше, чем регистрирует проточная цитометрия в групповых дезагрегатах, и составляет около 50 %. При этом гетероплоидные мозаики регистрировались гораздо реже и не имели дефицита клеток (Рис. 5, №2).
- Высокий уровень содержания триплоидов в этой группе сохранялся и на 10-й день развития (великонх), составляя 48 %.
- При дальнейшем культивировании из этих личинок был получен жизнеспособный спат.

Рисунок 5 – Структурная и генетическая характеристика двухдневных личинок, полученных при 15-минутном воздействии температурой 32 °C спустя 45 мин после оплодотворения (№1) и при 5-минутном воздействии через 25 мин после оплодотворения (№2). а – отдельный оптический срез личинки с визуализацией клеточных ядер (ядра посчитаны по всему объему мультисекционного изображения); б – определение класса плоидности отдельно взятой личинки (n) на основании измерения содержания ДНК в ее ядрах. Масштабный отрезок 10 мкм.